











































LISTE D'ESPÈCES

	 	Azuré des nerpruns (<i>Celastrina argiolus</i>) Bleu clair avec bordure sombre. Dessous gris très pâle, avec petits points noirs. Chenille sur différentes plantes (ronce, bruyère, houx, lierre, arbres fruitiers, etc).
	 	Argus commun (<i>Polyommatus icarus</i>) Bleu chez le mâle ; brun sombre bordé de points orange chez la femelle. Dessous brun clair avec points noirs cerclés de blanc, et bordé de points noirs et orange. Plusieurs espèces semblables. Chenille sur plusieurs plantes (trèfle, luzerne, etc.).
	 	Aurore (<i>Anthocharis cardamines</i>) Blanc avec une large tache orange vif sur les ailes avant des mâles. Femelle comme la Piéride de la rave mais dessous blanc marbré de vert. Chenille sur crucifères sauvages.
	 	Demi-Deuil (<i>Melanargia galathea</i>) Damier noir et blanc plus ou moins régulier. Chenille sur graminées.
	 	Gazé (<i>Aporia crataegi</i>) Blanc, presque transparent avec nervures noires très visibles. Chenille sur aubépine et prunellier.
	 	Piérides blanches (<i>Pieris</i>) Blanc avec un ou deux points noirs et une bordure sombre plus ou moins marquée au bout de l'aile avant. Dessous blanc jaunâtre avec nervures plus ou moins marquées. Plusieurs espèces semblables. Chenille sur crucifères sauvages et cultivées (choux, colza).
	 	Citron (<i>Gonepteryx rhamni</i>) Uniformément jaune vif chez le mâle et blanc verdâtre chez la femelle. Ailes se terminant en pointe. Dans le Sud, le mâle d'une espèce voisine (<i>Citron de Provence</i>) porte une large tache orange sur les ailes avant. Chenille sur nerprun et bourdaine.


	 	Flambe (<i>Iphiclides podalirius</i>) Jaune pâle zébré de larges bandes noires transversales. Ailes arrière prolongées par une longue queue et bordées de taches bleues dont une entourée de rouge orangé. Vol nonchalant. Chenille sur prunellier.
	 	Machaon (<i>Papilio machaon</i>) Jaune avec des dessins noirs réguliers. Ailes arrière prolongées par une queue et bordées de plusieurs taches bleues et d'une tache rouge orangé. Chenille sur carotte et fenouil.
	 	Cuivré commun (<i>Lycaena phlaeas</i>) Orange avec points noirs et bordé de brun sombre sur les ailes avant, et inversement brun sombre bordé d'orange sur les ailes arrière. Posé, ailes souvent entrouvertes. Chenille sur oseille et renouée.
	 	Hespérie de la houque (<i>Thymelicus sylvestris</i>) Brun orangé uni avec nervures parfois noires. Fine bordure noire. Trapu, vol saccadé. Posé, les ailes avant sont relevées par rapport aux ailes arrière. Plusieurs espèces semblables. Chenille sur graminées.
	 	Procris (<i>Coenonympha pamphilus</i>) Orange pâle avec fine bordure grise. Petit ocelle noir sur l'aile avant, plus marqué dessous. Dessous de l'aile arrière gris. Chenille sur graminées.
	 	Amarylitis (<i>Pyronia tithonus</i>) Orangé avec large bordure brun sombre régulière, se poursuivant parfois le long du corps. Un ocelle noir avec double point blanc sur l'aile avant. Chenille sur graminées.
	 	Belle-Dame (<i>Cynthia cardui</i>) Orange-rose avec taches noires. Bordure des ailes avant noire avec taches blanches. Dessous brun clair avec des dessins complexes, des zones blanches et une zone rosée souvent cachée. Papillon migrateur. Chenille sur plusieurs plantes (chardon, ortie, etc).




Petite Tortue (*Aglais urticae*)
Orange avec taches noires et jaunes caractéristiques sur l'aile avant. Bordure irrégulière noire avec des taches bleues. Dessous brun foncé. Chenille coloniale sur ortie.




Robert-le-Diable (*Polygonia c-album*)
Orangé parsemé de taches noires. Se distingue surtout par ses ailes irrégulièrement découpées. Dessous brun-orangé sombre avec un petit « c » blanc. Territorial. Chenille sur plusieurs plantes (ortie, houblon, saule, orme).



Souci (*Colias crocea*)
Jaune orangé largement bordé de noir. Dessous jaunâtre avec un point noir sur les ailes avant, et un point blanc entouré d'orange sur les ailes arrière. Papillon migrateur. Chenille sur luzerne et trèfle.



Tabac d'Espagne (*Argynnis paphia*)
Orangé vif avec taches noires plus ou moins alignées. Dessous de l'aile avant orangé. Dessous de l'aile arrière verdâtre avec des zébrures argentées. Chenille sur violettes.



Paon du Jour (*Inachis io*)
Rouge sombre avec un grand ocelle bleu, jaune, rouge et noir sur chaque aile. Chenille sur ortie.




Vulcain (*Vanessa atalanta*)
Noir avec une large bande rouge sur chaque aile. Taches blanches au bout des ailes avant. Papillon migrateur. Territorial. Chenille sur ortie.



Argus vert (*Callophrys rubi*)
Dessus brun, dessous vert métallique. Posé, ailes souvent fermées. Chenille sur différentes plantes (ronce, ajonc, bruyère, houx, chêne, etc).



Brun des pèlarгонiums (*Cacyreus marshalli*)
Brun sombre avec fine bordure noire piquetée de blanc. Très fine queue sur l'aile arrière avec un petit ocelle noir à la base. Dessous gris-brun marbré de bandes sombres. Espèce introduite d'Afrique du Sud en cours d'expansion. Chenille sur pèlarгонium (gèranium cultivé).




Grissette (*Carcharodus alceae*)
Brun clair marbré de brun foncé, gris et ocre. Bordures comme dentelées. Trapu, vol saccadé. Chenille sur les mauves.




Mégère (*Lasiommata megera*)
Brun avec des zones orangées plus ou moins larges comportant un grand ocelle noir à l'avant et deux à quatre petits à l'arrière. Une espèce semblable, l'Ariane, mais brun plus uni. Chenille sur graminées.




Moro-sphinx (*Macroglossum stellatarum*)
Brun-gris et orange, mais ailes presque invisibles à cause des battements très rapides. Corps trapu. Rarement posé, butine en vol sur place grâce à sa longue trompe, ce qui lui donne une allure d'oiseau-mouche. Chenille sur plusieurs plantes (gaillet, argousier, stellaires, aspérule, etc.).



Myrtil (*Maniola jurtina*)
Brun sombre avec zone orangée et ocelle noir à l'avant. Dessous plus clair avec une bande claire diffuse à l'arrière, et une zone orangée avec ocelle noir à l'avant. Chenille sur graminées.



Tircis (*Pararge aegeria*)
Damier brun et jaune orangé. Ocelles noirs avec centre blanc dans les taches orangées bordant l'aile arrière. Territorial, affectionne les taches de lumière. Chenille sur graminées.



Hespérie de la mauve (*Pyrgus malvae*)
Brun-noir maculé de petites taches blanches. Trapu, vol saccadé. Plusieurs espèces semblables. Chenille sur plusieurs plantes (potentille, ronce, mauve, etc).